



古本 博孝
徳島大学病院地域
産婦人科特任教授

**答
え**

子宮頸がんは
HPVウイルス
(HPV)の感染が原因で発生
します。頸がんの細胞検査では
見落としが10%あります。が、H
PV検査を併用すると見落とし
がほとんどなくなるため、頸が
ん検診には、細胞検査とHPV
の併用検診を勧めています。
徳島県では、検診に希望す
れば自己負担で検査できます。
ただ、20代ではHPVの感染率



27歳の未婚女性です。子宮頸がんの検診を受け、HPVウ
イルスに感染していると分かりました。医療機関での受診を
勧められ、ある病院を受診し、3回の検査を受けました。1、2回目の検査
では特に異常は指摘されなかったのですが、3回目の検査で、医師から「子
宮頸がんの前がん状態で、異形成の状態にある」との説明がありました。今
後は月1回、検査を受けるようにと言われているのですが、検査だけで、治
療はしなくても大丈夫なのでしょうか?

段階に応じて観察・切除

HPV感染 異形成の治療法は?

が高く、そのほとんどは消失す
るので、米国では30歳以上で
併用検査を勧めています。
ご質問の方は、最初の細胞検
査では異常がありませんでした
が、HPV検査が陽性だったの
ですね。

HPVは性行為によって感染
しますが、人類に広くまん延し
ており、25～30歳の女性では20
%が感染しています。ある時点
で20%が感染しているといつこ
とは、長期間追跡すると、ほと
んどの方が一生に数回は感染す
るということだと考えられます。
がほとんどなくなるため、頸が
ん検診には、細胞検査とHPV
の併用検診を勧めています。
徳島県では、検診に希望す
れば自己負担で検査できます。
ただ、20代ではHPVの感染率

しかし、数は少ないですが、
HPVが消失せず、持続感染に
移行する方がおられます。この
場合は、頸がんの発生する確率
が高くなるので注意が必要で
す。ご質問の方はHPVが消失

せん。妊娠中に発見された場合
は、分娩まで治療を待つことが
可能です。しかし、放置した場
合は平均5年で浸潤がんにな
り、浸潤がんになれば生命の危
険があります。

軽度異形成は、可逆的な病変
と考えられており、通常は経過
観察します。1年から1年半以
上治らない場合は治療しています。
悪性度の高いHPV型が陽性の
場合は、最初から治療してもよ
いし、経過観察も可能です。
中等度異形成は、当科のデ
ータでは50%くらいは自然に治る
ので、経過観察することが多い
ですが、1年から1年半以上治
らない場合は治療しています。
高度異形成は、自然に治るこ
ともありますが、通常は経過観
察しないで治療します。
なお、異形成の主な治療につ
いて、その内容を〈別表〉に示
しておきます。

異形成の治療	
レーザー蒸散	レーザーで病巣を蒸発させる方法。診断の確認ができないので、病巣が可視領域にある中等度異形成までが対象
LEEP切除	病巣を電気メスでくり抜く方法。診断の確認が可能。病巣が可視領域にあり面積が狭い上皮内がんまでが対象
LEEP切除+レーザー蒸散	LEEP切除とレーザー蒸散を組み合わせた方法。診断の確認が可能。病巣が可視領域にある上皮内がんまでが対象
円錐切除	子宮の下部を切除する方法。診断の確認が可能で安全。上皮内がんまでが対象
光線力学的治療	注射とレーザーで治療する方法。上皮内がんまでが対象。子宮は無傷で温存できるが、3週間薄暗い部屋に入院し、6ヶ月は直射日光を避ける必要がある
単純子宮全摘出術	子宮を摘出する方法。浅い浸潤がんまでが対象。閉経後の場合は浅い浸潤がんなどに行う

また現在は、HPVを予防す
るワクチンがあります。異形成
があつたり、HPV感染があつ
てもかまいませんので、ぜひ接
種することをお勧めします。

質問募集 がんに関する懇
談会「徳島がん対策センタ
ー」がお答えします。質問内
容を詳しく書き、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を明記
し、〒770-8572徳島
新聞社文化部「がん相談係
へ。紙上に住所、氏名、電話
番号は掲載しません。同ゼン
タ（電088（633）9
438）でも平日午前8時半
～午後5時に受け付けていま
す。